

Zusammenfassung.

Es wird über die bisher bekannt gewordene und erweiterte Kasuistik von bösartigen Lungen- und Pleuragewächsen bei Asbestose aus dem Weltschrifttum berichtet. Die Gründe, welche einen ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen nahelegen, werden aufgezeigt. Das klinische Bild des Lungentumors bei Asbestose wird besprochen und die Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf diese Komplikation für angebracht gehalten.

Schrifttum.

Brader, E. W.: Dtsch. med. Wschr. 1939 I, 407. — Egbert, D. S. and A. J. Geiger: Amer. Rev. Tbc. 34, 143 (1936). — Gloyne, S. R.: Tubercle 14, 550 (1933); 17, 5 (1935); 18, 100 (1936)¹. — Hornig, F.: Z. Krebsforsch. 47, 281 (1938). — Linzbach, A. J. u. H. W. Wedler: Virchows Arch. 307, 387 (1941). — Lynch, K. M. and W. A. Smith: Amer. J. Canc. 24, 56 (1935). — Nordinann, M.: Z. Krebsforsch. 47, 288 (1938). — Ber. 8. internat. Kongr. Unfallmed. u. Berufskrh. Frankfurt a. M., Bd. 2, S. 983. Leipzig: Georg Thieme 1939. — Nordinann, M. u. A. Sorge: Z. Krebsforsch. 51, 168 (1941). — Sparks, J. V.: Brit. J. Radiol. 11, 371 (1938). — Wedler, H. W.: Klinik der Lungenasbestose. Leipzig: Georg Thieme 1939.

¹ Die Originalarbeit lag dem Verfasser nicht vor.