Table 2.2-13
Concentrations of polychlorinated biphenyls (PCB's)
in Fish from Saginaw River, December 7, 1971
(ppm; wet weight)

Species	Location	Length	Percent fat	PCB's based upon 1242 standard
Perch	Karn Weadock Discharge Channel	9.0	1.3	16.3
Carp	" " " "	21.0	0.9	8.8
Catfish	" " " "	8.0	7.0	37.1
Catfish	" " " "	7.5	4.9	47.9
Carp	U.S. Coast Guard Station	23.0	---	48.0
Carp	" " " "	24.0	10.5	20.4
Carp	" " " "	20.0	6.5	15.5
Carp	" " " "	24.0	5.9	45.8
Carp	" " " "	21.0	4.6	30.2
Pike	" " " "	27.0	1.6	16.6
Pike	" " " "	23.0	1.1	6.9
Gizzard Shad	" " " "	14.0	17.5	165.3
Gizzard Shad*	" " " "	6.0	15.3	32.5
Gizzard Shad*	" " " "	4.5	15.0	161.9
Gizzard Shad*	" " " "	5.0	17.0	77.0
Gizzard Shad*	Zilwaukee Bridge	4.5	15.7	24.1
Gizzard Shad*	" "	5.0	9.6	52.0
Gizzard Shad*	" "	5.0	8.7	10.4

*Concentration based upon analysis of whole fish. All others based upon edible portion only.

SOURCE: Hesse, J.L., Status Report on Polychlorobiphenyls in Michigan Waters, Michigan Water Resources Commission, (June 1973).