

utile per seguire il divenire radiologico del singolo esposto, piuttostochè per confronti su campioni. Appare comunque fondamentale l'integrazione, con essa apportata, del « tipo » radiologico con i caratteri di profusione e di estensione: senza di essi, infatti, si sarebbe portati a conclusioni affrettate sulla frequenza dei diversi tipi, e quindi, praticamente, di diverse gravità della malattia in questo rispetto a quel settore manifatturiero. Resta comunque valido il rilievo qui effettuato dell'importanza e anche della frequenza, soprattutto in presenza di prolungati periodi di esposizione al rischio, dell'asbestosi nei lavoratori del cemento-amianto (SOLTE, 1970): questo ci sembra soprattutto valido in quanto riferito alla situazione di quest'industria nella nostra regione, ove essa ha un ricambio di mano d'opera senz'altro inferiore a quello del settore amiantiero tessile, a differenza di quanto avviene in altri Paesi (BOHLIG, 1970).

TAV. 28 - Invalidità per asbestosi riconosciuta.

Fase di lavorazione	Totale casi riconosciuti N° 2 sugli appartenenti alla fase	Invalidità percentuale riconosciuta M
1 ^a	43 28,9	38,40
2 ^a	48 25,4	35,21
3 ^a	35 27,9	30,43

La mansione lavorativa, anche se più brevemente riassunta in fasi, come in questa relazione, si è rivelata, come in parte prevedibile, una condizione determinante della frequenza e dell'importanza del quadro di asbestosi riscontrato. Anche in questo caso è apparsa indispensabile l'integrazione della classificazione radiologica sui suoi tre cardini: tipo, profusione ed estensione. Fra tipo radiologico s e tipo t (il tipo u era quasi assente nella nostra casistica) esiste un profondo divario nell'entità della compromissione funzionale. Infatti già il solo tipo, a prescindere dalla profusione e dall'estensione, consente di prevedere la gravità della compromissione funzionale.

La nostra indagine ha inoltre confermato l'importanza della compromissione pleurica nell'asbestosi (KIVILUOTO, 1966-b): noi pensiamo che si possa parlare di asbestosi della pleura accanto all'asbestosi parenchimale polmonare (SOLOMON, 1970), e che questa compartecipazione debba avere anche, oltrechè importanza diagnostica, un riconoscimento all'atto della valutazione dell'invalidità, essendo caratteristica dell'affezione e comportando verosimilmente un aggravamento della compromissione funzionale. Nella nostra casistica di esposti, oltre un quinto dei casi aveva una compromissione pleurica, pur essendo stati esclusi a priori tutti i soggetti con anamnesi positiva per una qualsiasi delle affezioni causa abituale di alterazione pleurica. La fondatezza di questa nostra opinione troverà ulteriore conferma dai dati relativi all'epidemiologia del mesotelioma pleurico.

Sempre a questo riguardo ci sembra ben confermata la particolare modalità patogenetica delle calcificazioni pleuriche, condizionate soprattutto dal tempo intercorso, più che dall'entità dell'esposizione all'asbesto.

Circa la compromissione sede soltanto con i due essa appare da questo p fatturiero (maggiore nei iniziali in genere) a parit Il comportamento rispetti pressione che permangan lavoratori più validi.

A parità di tipo radi incide funzionalmente in città Vitale e VEMS; il sul VEMS. I due indici città Vitale, hanno con Coll., 1966; BECKLAKE e compromissione funziona

Un ulteriore approfondo circa la compromissione localizzazioni diaframma decremento funzionale a le parietali risultano fu è solo da un lato.

Resta inoltre conferm meno elettrocardiografica. (SCANSETTI e RUBINO, 19 da asbestosi polmonare a risentimento ecgrafico del serve nella silicosi.

Per quanto riguarda i è apparso che il ricono scindere dalla fase lavora larmente contrasta con i aspettativa, i quali sostenj col progredire della lavor

Sono presi in esame 635 s tori manifatturieri della nostr e frizioni, tessili. Circa due riconoscimento della malattia motivi diversi. I dati clinici, sia per decenni di durata di intesa, in via semplificativa mente iniziale, intermedia o del torace sono stati classificati metà dei casi presenta un ti cento un tipo « t », mentre c parenchimali significative per parga di opacità tipo « s » o « agli altri due settori manufat appartenenti alle fasi iniziali di tenenti alle fasi iniziali hann