

Le tavole 14 e 15 considerano anzitutto i casi con almeno una delle alterazioni pleuriche ricercate (infatti non infrequentemente si è rilevata la contemporanea presenza di due o più fra esse nello stesso soggetto, in particolare rispettivamente di calcificazioni parietali e della pleura diaframmatica, e di ispessimenti parietali ed oblitterazione costofrenica). Più di un quinto dei componenti la casistica era portatore di almeno una alterazione pleurica, e

TAV. 14 - Alterazioni pleuriche. Casi con almeno una alterazione.

Settore manfatturiero	N°Casi	% rispetto agli appartenenti al settore	Ripartizione % per decenni di esposizione			
			I	II	III	IV
C. A.	40	21.4	18.0	31.2	37.4	12.5
F. F.	38	17.6	10.7	32.2	32.2	25.0
T.	81	25.0	30.2	37.2	18.0	13.0
Totale	137	21.6				

taie percentuale raggiungeva un quarto dei soggetti nei tessili; in questi ultimi si assiste anche ad una maggior precocità nella comparsa delle alterazioni. Invece non vi sono differenze di incidenza fra prima e seconda fase

TAV. 15 - Alterazioni pleuriche - Casi con almeno una alterazione.

Fase di lavorazione	N°Casi	% rispetto agli appartenenti al la fase	Ripartizione % per decenni di esposizione			
			I	II	III	IV
1 ^a	38	22.4	38.0	33.3	22.2	8.5
2 ^a	44	23.2	15.9	31.8	59.4	22.7
3 ^a	23	18.4	8.7	20.2	34.8	17.4

di lavorazione, mentre essa è minore nella terza fase: marcata infine la precocità di comparsa delle alterazioni pleuriche negli esposti in lavori delle fasi iniziali, rispetto agli appartenenti alle intermedie e finali nell'ordine.

Considerando le singole alterazioni, a volte ricorrenti, come si è detto, nello stesso soggetto, ciascuna di esse (tavola 16) è più frequente nei tessili che negli altri settori manifatturieri. L'alterazione più frequente in assoluto è l'ispessimento parietale (SOLOMON, 1970), seguito dall'oblitterazione dell'angolo costo-frenico, e dalle calcificazioni in sede diaframmatica ed infine pa-

rietaie. Rispetto alle fasi di alterazioni e gli ispessimenti cazioni prevalgono nell'inte quanto già rilevato in inda. 1970), e anche dalle ricerche

TAV. 16

Settore manfatturiero	Totale alterazioni
C.A.	48
F.F.	50
T.	88
Sul totale generale	185

KIVILUOTO, 1966 a; RUBINO 1970), e cioè che le calcificazioni effetto di blande esposizioni LOMON, 1970) essendo quindi terminante. A sostegno di c

TAV. 17

Fase di lavorazione	Totale alterazioni
1 ^a	48
2 ^a	55
3 ^a	38

vola 18 che mentre l'incidenza quella dell'ispessimento parietale il prolungarsi della durata di riguarda le calcificazioni parietali modo corrispondente ad un

Da un punto di vista fisiologico, i parametri spirometrici, Capa sotto forma di percentuali C.E.C.A.