

Tabelle 1.

a	b	c	d	e	f	g
Lfd. Nr.	Alter, Geschlecht	Staubarbeit Jahre	Freies Intervall Jahre	Stadium der Asbestose	Todesursache	Publiziert durch
1	35 J., ♀	?	?	III		Fahr 1914
2	47 J., ♂	28		III		Buresch/Loeschcke 1931
3	50 J., ♂	21		III		Beintker/di Biasi, 1931/37
4	? ♂	20		III		Beintker/Path. Inst. Münster 1931
5	35 J., ♂	20		III		Stroebe/Beger 1933
6	31 J., ♂	8		II—III		Bohne 1936
7	54 J., ♀	11		III		Saupe/Letterer 1938
8	44 J., ♀	18		III		Saupe/Baniecki 1938
9	38 J., ♀	13		III		Wedler/Walkhoff 1939
10	45 J., ♂	15		III		Wedler 1939
11	63 J., ♂	12	6	III		Wedler/Koch 1939
12	69 J., ♂	10		III		Wedler 1939
13	61 J., ♂	10		II	Magen-Ca.	Wedler/Walkhoff 1939
14	35 J., ♂	7	9	II	Bronchial-Ca.	Nordmann 1938
15	55 J., ♂	7	12	III	Bronchial-Ca.	Nordmann 1938
16	38 J., ♂	12	7	III	Lungenabscess, Empyem	Nordmann 1938
17	58 J., ♂	10	2	III	Bronchial-Ca.	Bohne/Wedler 1939
18	60 J., ♂	18	1	III	Bronchial-Ca.	Wedler/Linzbach 1940
19	70 J., ♂	16	1	III	Oesoph.-Ca.	di Biasi u. a.
20	60 J., ♂	42	1/2	1—II	Pleura-Ca.	Alwens/Fischer-Wassels
21	38 J., ♂	4	1	III		Bohne
22	54 J., ♂	27		III		Koopmann
23	59 J., ♂	4	6	III		Bohne
24	52 J., ♂	3,25	2	III		Holm u. a.
25	66 J., ♂	22	2	III	Prostata-Ca.	
26	42 J., ♂	6	10	I	Lungenabscess, Amyloidose	Wedler/Poczka
27	50 J., ♂	12	2	III	Sterensuff.	Wedler u. a.
28	35 J., ♂	5,5	6	I?	Lungentbk.	Wedler u. a.
29	18 J., ♂	1,75		0	Lungentbk.	di Biasi u. a.
30	40 J., ♂	10	?	III	Pleuragewächs	Teutschlaender

kleinen Zahlen erlauben allerdings hieraus zunächst noch keine besonderen Schlüsse. Nach der Geschlechtsverteilung kommen auf 4 Männer 2 Frauen mit Lungengewächsen. Für die Geschlechtsverteilung der Krebse der Lunge unter Männern und Frauen werden sonst Zahlen von 3—4 : 1 angegeben. Die Quote der lungenkrebskranken Asbestarbeiter nach dem Geschlecht ist natürlich auch abhängig von der Zahl der in den Betrieben arbeitenden Frauen und Männer. In Deutschland überwiegen die ersten bei weitem. Bei den beiden obengenannten Frauen