TAV. 18 - *Singole alterazioni pleuriche.*

Decenni di esposizione	Totale alterazioni N°	Angolo costofrenico	Ispessimento parietale	Calcificazione parietale	Calcificazione diaframmatica
		(Frequenza % sul totale degli appartenenti al decennio con specificazione della fase lavorativa)			
I	24	3.3	4.8	0.4	0.4
II	41	6.4	8.9	1.5	3.4
III	48	11.0	16.9	5.1	5.9
IV	28	8.9	15.9	15.5	15.5

TAV. 19 - *Campione Generale.* Funzionalità respiratoria.

Fase di lavorazione	CV/CV teor. % M	VEMS/VEMS teor. % M
1ª	72.93 ± 14.21	69.76 ± 16.91
2ª	76.44 ± 13.15	72.84 ± 17.54
3ª	78.45 ± 11.85	76.10 ± 17.10

TAV. 20 - *Tipo 0 di opacità radiologica.* Funzionalità respiratoria.

Fase di lavorazione	CV	VEMS
1ª	77.02 ± 14.19	69.53 ± 18.87
2ª	82.84 ± 10.88	75.36 ± 19.30
3ª	84.92 ± 10.79	77.05 ± 20.18

TAV. 21 - *Tipo radiologico s.* Funzionalità respiratoria.

Fase di lavorazione	CV	VEMS	Profusione minima CV	minima VEMS	bassa CV	bassa VEMS	alta CV	alta VEMS
1ª	72.21	70.81	74.72	72.52	71.48	69.31	67.30	69.10
2ª	73.13	71.77	76.30	72.92	72.02	71.94	65.32	66.64
3ª	75.88	75.15	78.84	78.88	75.52	73.98	71.87	74.33

Si rilevano due comport
appartenenti alle fasi inizial
esaminati, valori di ambo
mente, a quelli degli appart
valido sul campione general
opacità radiologiche riferibi
(tavola 21) e t (tavola 22, a

TAV. 22 - *Tipo*

Settore manufatturiero	CV
C. A.	71.84
F.F.	74.88
T.	83.14

fra prima e seconda fase, n
tavola 21, che riguarda, cor
tità del decremento, soprat
profusione delle opacità.

Il secondo rilievo rigua
spetto al settore manufatturi
significativamente inferiori
sinistra), un po' meno evide

TAV. 23 - *Tipo*

Settore manufatturiero
C.A.
F.F.
T.

inoltre vedere che, anche c
il medesimo, in maniera pi

Nelle tavole 24 e 25 al
alterazioni pleuriche, distir
alle localizzazioni parietali.
ogni gruppo sono dati i v
senza alterazione, o con a
rileva, sia nel caso degli is

